

Annexe K : Liste de contrôle de dépistage abrégée – révisée

Ensemble des troubles causés par l'alcoolisation fœtale

Liste de contrôle de dépistage abrégée – révisée

Participant

Instructions

La liste de contrôle devrait être remplie par le personnel au cours de l'entrevue de consentement avec le participant.

On doit répondre à toutes les questions de la liste de contrôle. Si le répondant ne connaît pas la réponse à une ou plusieurs questions, encerclez « ne sais pas » ou « inconnu ». Pour les questions qui ne s'appliquent pas, cochez « sans objet » ou « ne buvait/consommait pas ». Ne laissez aucune question sans réponse.

Client (nom) : _____

N° de cas : _____

SED : _____

Date : _____

Ensemble des troubles causés par l'alcoolisation fœtale

Liste de contrôle de dépistage abrégée – révisée

N° de cas : _____

Date : _____

Partie 1

Indicateurs comportementaux

La première série de questions porte sur votre comportement et vos aptitudes.

Instructions : Répondez aux questions suivantes. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Je vais commencer à vous poser la première série de questions maintenant.

Diriez-vous de vous-même que vous êtes quelqu'un qui :	Oui	Non
1. Agit impulsivement	1	0
2. A du mal à suivre des instructions	1	0
3. Est agité	1	0
4. A des problèmes d'orthographe	1	0
5. Fait preuve de mauvais jugement	1	0
6. Est facilement distrait	1	0
7. Pique des colères	1	0
8. A des sautes d'humeur importantes	1	0
9. Est hyperactif	1	0
10. A un problème avec l'argent	1	0
11. Ne semble pas conscient des conséquences de ses actes	1	0
12. A des problèmes de mathématiques	1	0
13. Interrompt beaucoup la conversation	1	0
14. Est inquiet	1	0
15. Est très étourdi dans la vie quotidienne	1	0
16. Parle beaucoup mais ne dit pas grand-chose	1	0
17. A des problèmes de mémoire	1	0
18. A des problèmes de lecture	1	0
19. Est facilement pris pour cible	1	0
20. A du mal à terminer une tâche	1	0
21. Est très étourdi dans la vie quotidienne	1	0
22. A peu d'amis	1	0
23. Est facilement manipulé	1	0
24. Est désorganisé	1	0
25. A du mal à rester concentré sur un sujet	1	0
26. Manque d'habiletés sociales	1	0

Score aux indicateurs comportementaux _____ (maximum 26)

- 0-9 = faible risque**
- 10 ou plus = risque moyen à élevé**

Partie 2
Indicateurs historiques

La deuxième série de questions porte sur vos antécédents.

Instructions : Répondez de votre mieux aux questions suivantes. Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Je vais commencer à vous poser la deuxième série de questions maintenant.

27. Avez-vous été adopté ? **Oui Non Ne sais pas**

28. Combien de fois avez-vous été placé dans une famille d’accueil ?
Jamais 1 ou 2 fois 3 fois ou plus Ne sais pas

30. Avez-vous eu des problèmes scolaires dans votre jeune âge ? **Oui Non Ne sais pas**

31. Combien de fois avez-vous été soigné pour des troubles mentaux ?
Jamais 1 ou 2 fois 3 fois ou plus Ne sais pas

Score relatif aux indicateurs historiques _____ (maximum 6)

Score :

- 0-1 = faible risque**
- 2 ou plus = risque moyen à élevé**

Partie 3
Indicateurs maternels

La dernière série de questions concerne la consommation d'alcool de votre mère quand vous étiez jeune et pendant qu'elle était enceinte de vous.

Instructions : Répondez de votre mieux aux questions suivantes. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, faites simplement de votre mieux. Je vais commencer à vous poser la dernière série de questions maintenant.

32. Est-ce que votre mère buvait quand vous étiez jeune ? **Oui Non Ne sais pas**
(Si la réponse est « non » ou « ne sais pas », passez à la question 35)

33. Dans l'affirmative : à quelle fréquence votre mère buvait-elle ?

<input type="checkbox"/> Une fois par mois ou moins	<input type="checkbox"/> Ne sais pas
<input type="checkbox"/> 2 à 4 fois par mois	<input type="checkbox"/> Sans objet
<input type="checkbox"/> Au moins 2 fois par semaine (<i>risque élevé</i>)	

34. Combien de verres d'alcool consommait-elle généralement par occasion ?

Un verre standard est défini comme suit :

- 12 oz (341 ml, bouteille standard) de bière ordinaire
- 5 oz (142 ml, verre à vin de taille normale) de vin de table
- 3 oz (85 ml) de vin fortifié (xérès, porto, vermouth),
- 1,5 oz (43 ml, une dose) de spiritueux (whisky, rhum, gin)

<input type="checkbox"/> Un à trois	<input type="checkbox"/> Ne sais pas
<input type="checkbox"/> Quatre ou plus (<i>risque élevé</i>)	<input type="checkbox"/> Sans objet

(« Au moins deux fois par semaine » et/ou « quatre verres ou plus » = *risque élevé*)

35. Est-ce que votre mère buvait quand elle était enceinte de vous ? **Oui Non Ne sais pas**

(Si la réponse est « non » ou « ne sais pas », passez à la question 37)

Qui vous a dit que votre mère buvait pendant la grossesse ?

- Mère
- Autres parents
- Amis
- Parent nourricier/adoptif
- Professionnel de la santé
- Aîné
- Autre : _____

Suite du tableau à l'autre page

37. Votre mère a-t-elle consommé d'autres drogues pendant la grossesse ?

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Tabac | <input type="checkbox"/> Ne sais pas |
| <input type="checkbox"/> Médicament sur ordonnance – prescrit par un médecin | <input type="checkbox"/> Ne se droguait pas |
| <input type="checkbox"/> Médicament sur ordonnance – pris sans ordre du médecin | |
| <input type="checkbox"/> Drogues illicites (p. ex. marijuana, hachisch, cocaïne, héroïne) | |

Quelles drogues est-ce qu'elle consommait ?

Il n'y a pas d'autres questions. Merci d'avoir répondu.

NOTE À L'INTERVIEWEUR : Veuillez fournir tout autre détail dont il a été question pendant l'entrevue au sujet du comportement du participant, de ses antécédents familiaux ou de la consommation d'alcool par la mère.

RENOI À UNE ÉVALUATION DE SUIVI

Critères relatifs au comportement, aux antécédents et aux données relatives à la mère :

- Indicateurs comportementaux** Score de 10 ou plus (*nécessaire*)
- Indicateurs historiques** Score de 2 ou plus (*nécessaire*)

Au moins un des deux suivants est nécessaire :

- Indicateurs maternels** Réponse d'« au moins deux fois par semaine » pendant l'enfance et/ou
- Indicateurs maternels** Réponse de « quatre verres ou plus par occasion » pendant l'enfance

Évaluation finale du délinquant

- Risque de trouble appartenant à l'ensemble des troubles causés par l'alcoolisation fœtale** (suivi nécessaire)
- Aucun risque de trouble appartenant à l'ensemble des troubles causés par l'alcoolisation fœtale**